

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-9-9-87036321



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 106  
du 2 septembre 1987

### VIGNE

#### **\*\* Tordeuses de la grappe**

Le vol se poursuit sur la plaine orientale et jusqu'à PORTO VECCHIO.  
Ce vol tardif (les captures ont réellement débuté le 17 août) risque d'être étalé.

Si vous avez effectué un traitement préventif, vérifiez son efficacité.  
Un traitement curatif ne sera nécessaire que si vous observez une chenille pour  
10 grappes.

Si le traitement préventif n'a pas été réalisé, il est trop tard.  
Dénombrez les chenilles afin de réaliser un traitement curatif.

En curatif, utilisez des produits à base de parathion.

Dans les autres régions, inutile de traiter.

#### **\*\* mildiou**

Vous pouvez encore réaliser un dernier traitement au cuivre.

#### **\*\* botrytis**

Pour le moment les risques sont nuls, mais les conditions atmosphériques  
sont très instables, et des précipitations subites pourront entraîner des développe-  
ments de pourriture grise. Dans les parcelles sensibles et cépages à grappes serrées  
il vaudrait mieux effectuer le dernier traitement = 3 semaines avant les vendanges.

Vous avez le choix entre :

#### **les imides cycliques**

KIDAN, ROVRAL, SUMISCLEX, RONILAN, RONILAN FL, RONILAN SP ou SILBOS T

#### **les autres produits**

BASULTRA, BTF, CODICAP, CODICAP L, EUPARENE, MYCODIFOL, ORGANIL 648, QUINARIS M.

.../...

P19

## AGRUMES

### **\*\* gombose**

C'est le moment de réaliser le traitement avec le phosethyl - al (ALIETTE) à la dose de 0, 25 kg /hl sur toutes les parcelles où se trouvent des arbres atteints de gombose (écorce craquelée, écoulement de gomme ...).

--> Evitez en même temps les excès d'humidité à la base du tronc.

--> Bien mouiller les différentes parties de l'arbre (quantité de bouillie 2000 l/ha).

--> Sur attaque déclarée, vous pouvez avoir un effet curatif avec deux traitements à 30 jours d'intervalle.

### **\*\* aleurodes, pucerons, acariens, cochenilles**

De nombreux aleurodes sont visibles, des pucerons se développent sur jeunes pousses, on observe des acariens et des cochenilles.

Vous pouvez réaliser dès maintenant , un traitement insecticide généralisé.

Si les pucerons sont nombreux, préférez les produits à base de pirimicarbe ou de vamidothion.

Bien mouiller la végétation 2000 l/ha .

## CULTURES LEGUMIERES

### **\*\* nécrose apicale de la tomate**

Des taches apparaissent à l'extrémité opposée au péduncule . D'abord blanchâtre, la zone nécrosée se déprime en séchant et noircit. Cet accident physiologique est du à une **alimentation** en eau **irrégulière**.

### **\*\* alternaria de la tomate**

Se manifeste sur feuilles par des taches noires entourées d'un halo jaune . On observe les mêmes taches sur fruits au voisinage du péduncule.

La lutte est possible avec :

- chlorothalonil	DACONIL
- manébe	NS
- mancozébe	NS
- propinébe	NS